

**PROCESSO SELETIVO PARA
ODONTÓLOGO RESIDENTE 2013/2014****PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Hospital Municipal São JOSÉ**

Código: 780

***CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCO-MAXILO-FACIAL*****Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:**

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

30 questões cujo conteúdo programático corresponde à formação profissional do Odontólogo**INSTRUÇÕES:**

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a presença do fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e ESPECIALIDADE. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, sem rasuras e apenas uma **ÚNICA** alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos, bem como consulta a qualquer obra ou anotação, o uso de relógio, telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico, bem como bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura.
- O tempo de duração da prova será de **até 3 horas**, incluído o preenchimento do cartão de respostas. O candidato somente poderá entregar a prova e o cartão de respostas depois de transcorridos 30 minutos do seu efetivo início.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** obrigatoriamente ao Fiscal da sala, o seu cartão de respostas devidamente assinado e o caderno de provas. A prova e o gabarito preliminar serão divulgados no endereço eletrônico www.objetivas.com.br no dia útil seguinte à realização da prova.
- A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
- Os três últimos candidatos somente poderão entregar a prova e o cartão de respostas ao mesmo tempo.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

✂..... (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas)

01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐
16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A osteorradionecrose é uma das sequelas mais graves e difíceis da radioterapia para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O osso dentro do feixe de radiação torna-se virtualmente não vital devido a uma _____. O osso da _____ é o mais afetado com ulcerações que não cicatrizam e osteorradionecrose.

- a) xenoarteíte - maxila
- b) hiperarteíte - mandíbula
- c) hiperarteíte - maxila
- d) xerosteíte - mandíbula
- e) endarterite - mandíbula

2) A literatura descreve que quanto mais rápido for iniciada a radioterapia mais benefícios um paciente terá. Porém, após uma exodontia, um período de tempo é necessário para cicatrização/reepitelização. Tradicionalmente, sugere-se que o período de espera entre a exodontia e a radioterapia seja de:

- a) 1 a 3 dias.
- b) 2 a 5 dias.
- c) 4 a 8 dias.
- d) 7 a 14 dias.
- e) 30 a 45 dias.

3) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A ocorrência de cálculos nas glândulas salivares é _____ vezes mais comum em _____, com incidência maior na faixa etária entre os 30 e os 50 anos. A incidência de cálculos na glândula parótida gira em torno de _____.

- a) duas - homens - 10%
- b) três - homens - 65%
- c) duas - mulheres - 65%
- d) três - mulheres - 10%
- e) quatro - mulheres - 65%

4) As fraturas de mandíbula podem ser classificadas conforme a direção da fratura e o prognóstico, a severidade, a presença ou a ausência de dentes e o tipo de fratura. Sobre a classificação do tipo de fratura, analisar os itens abaixo:

- I - Na fratura em vara verde, há descontinuidade incompleta do osso.
- II - Na fratura cominutiva, há poucos fragmentos.
- III - Na fratura impactada, os fragmentos são impelidos para a região da ATM, impactando a articulação.
- IV - A fratura complexa apresenta microfragmentos espalhados por toda a região, mas não afetando tecidos circunjacentes.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Somente os itens III e IV.
- e) Somente o item III.

5) A diluição dos vasoconstritores é comumente designada pela proporção (por exemplo, 1 para 1.000 (escrito 1:1.000)). Uma vez que as doses máximas dos vasoconstritores são indicadas em miligramas, a proporção 1:100.000 significa que existe:

- a) 1 miligrama de um soluto em 100.000ml da solução.
- b) 1 micrograma de um soluto em 100.000ml da solução.
- c) 1ml de um soluto em 100.000ml da solução.
- d) 1.000 miligramas de um soluto em 100.000ml da solução.
- e) 1.000 miligramas de um soluto em 100.000mg da solução.

6) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A adrenalina é altamente solúvel na forma _____. A vida em prateleira de um tubete anestésico local de adrenalina contendo vasoconstritor é mais _____ do que a de um tubete anestésico sem vasoconstritor. A adrenalina tem seu mecanismo de ação atuando diretamente nos receptores _____.

- a) ácida - curta - α e β adrenérgicos
- b) ácida - longa - α e β parassimpáticos
- c) básica - curta - α e γ adrenérgicos
- d) básica - longa - α e γ parassimpáticos
- e) básica - curta - γ e β adrenérgicos

7) Em relação aos anestésicos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Bupivacaína é um anestésico local da categoria Amida.
- () Lidocaína é um anestésico local da categoria Amida.
- () Prilocaína é um anestésico local da categoria Ester.
- () Procaína é um anestésico local da categoria Ester.
- () Mepivacaína é um anestésico local da categoria Amida.

- a) C - E - C - E - C.
- b) E - C - C - C - E.
- c) E - C - E - E - C.
- d) C - C - E - C - C.
- e) C - C - C - C - E.

8) O Sistema de Estadiamento Metástase-Tumor-Nodo para carcinoma bucal é usado para a maioria dos cânceres humanos. Esse protocolo de estadiamento depende dos seguintes aspectos clínicos básicos:

- I - T: o tamanho do tumor primário, em milímetros.
- II - T: o tamanho do tumor primário, em centímetros.
- III - N: envolvimento de linfonodos locais.
- IV - N: número de órgãos locais envolvidos.
- V - M: metástases distantes.
- VI - M: metástases envolvendo células do tumor primário.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I, IV e V.
- b) Somente os itens I, III e VI.
- c) Somente os itens II, III e V.
- d) Somente os itens I, IV e VI.
- e) Somente os itens II, III e IV.

9) Sobre a Síndrome de Gardner, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) É herdada como um traço autossômico dominante com quase 100% de penetrância.
- b) O gene responsável foi detectado no cromossomo 20.
- c) Em torno de 10% dos pacientes com essa síndrome demonstram anormalidades no esqueleto.
- d) Aproximadamente 50% dos pacientes com essa síndrome desenvolvem carcinoma bucal.
- e) Pólipos bucais são alterações comuns em pacientes com essa síndrome, visto que há formação de pólipos múltiplos em todo o corpo.

10) Em relação aos anestésicos locais, analisar os itens abaixo:

- I - Todos os anestésicos locais injetáveis com eficácia clínica possuem certo grau de atividade vasodilatadora.
- II - O grau de vasodilatação é igual para procaína e mepivacaína.
- III - O grau de vasodilatação dos anestésicos pode variar de acordo com o tipo de anestésico, o tempo de injeção, o local da injeção, o formato da agulha, a profundidade da injeção e o conservante utilizado no líquido.
- IV - Uma das funções dos vasoconstritores adicionados aos anestésicos é retardar a absorção do anestésico local para o sistema cardiovascular.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens II, III e IV.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Somente os itens I e IV.

11) O tubete dental anestésico cheio com 1,8ml da solução consiste em quatro partes, que são:

- a) Diafragma, tampa de zinco, rolha e cilindro de vidro.
- b) Tampa de cobre, diafragma permeável, embolo e cilindro.
- c) Tampa plástica, cilindro de plástico, embolo e membrana permeável.
- d) Rolha, membrana permeável, cilindro de vidro e tampa plástica.
- e) Diafragma, tampa de alumínio, rolha e cilindro de vidro.

12) A imunoistoquímica é o conjunto de procedimentos que utiliza:

- a) Antígenos como reagentes específicos para detecção de antígenos presentes em células ou tecidos.
- b) Indicadores eletroativos histoquimicamente para detecção de antígenos presentes em células ou tecidos.
- c) Anticorpos como reagentes específicos para detecção de antígenos presentes em células ou tecidos.
- d) Indicadores eletroativos histoquimicamente para detecção de anticorpos presentes em células ou tecidos.
- e) Indicadores radioativos específicos para detecção de antígenos presentes em células ou tecidos.

13) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Há dois tipos básicos de traqueotomia: a _____, a qual é feita acima do istmo tireoidiano, e a traqueotomia baixa, que é feita abaixo ou sobre o istmo da glândula tireoide. A coniotomia é sempre uma medida de emergência, mas pode produzir complicações indesejáveis, como _____. Esse método também é conhecido como _____.

- a) enfusotomia - fibrose - método de Vicq D'Azyr
- b) coniotomia - fibrose - laringotomia intercricotiroideana
- c) cricotomia - espasmo - método de Sicher
- d) coniotomia - espasmo - método de Vicq D'Azyr
- e) enfusotomia - espasmo - laringotomia intercricotiroideana

14) Na cirurgia pré-protética de redução do tubérculo Geni, a inserção de um músculo necessita ser removida, contribuindo para o sucesso da cirurgia. Que músculo é esse?

- a) Genioglosso.
- b) Milo-hióideo.
- c) Platisma.
- d) Pterigóideo lateral.
- e) Pterigóideo medial.

15) A actinomicose é uma infecção primariamente dos tecidos moles orais e progride, por contiguidade, aos tecidos subjacentes. Diferentemente de outras infecções, essa não se dissemina através dos planos anatômicos. Em vez disso, fixa-se no interior desses planos. Os agentes causadores são os(as):

- a) Fungos aeróbicos.
- b) Fungos anaeróbicos.
- c) Bactérias aeróbicas.
- d) Bactérias anaeróbicas.
- e) Fungos facultativos mistos.

16) Sobre as citocinas, analisar os itens abaixo:

- I - São proteínas que regulam e determinam a natureza da resposta inflamatória.
- II - Foram inicialmente designadas interleucinas.
- III - São sintetizadas por células que não contêm ribossomos.
- IV - São secretadas por longos períodos de tempo, até finalizar o processo inflamatório.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II, III e IV.
- c) Somente os itens I e IV.
- d) Somente o item II.
- e) Somente o item I.

17) A leucoplasia, como a maioria das lesões brancas, tem a cor branca resultante de:

- a) Necrose superficial e profunda do tecido epitelial, resultante de ações químicas de radiações solares.
- b) Uma camada de ceratina superficial espessada ou uma camada espinhosa espessada, que mascara a vascularidade normal do tecido conjuntivo subjacente.
- c) Necrose apenas superficial do tecido epitelial, resultante de irradiações.
- d) Formação extra de ceratina na parte profunda da derme, o que transpassa, por meio de difração, a superfície externa do epitélio, resultante em imagem tridimensional de tecido esbranquiçado.
- e) Uma camada de ceratina profunda espessada extremamente vascularizada e innervada, dando sensação de ardência à ação de radiações solares.

18) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A Síndrome de Sjögren é uma doença de desordem auto-imune sistêmica crônica. A prevalência é maior no sexo _____, e a ocorrência é predominante nos adultos de _____. Quando a condição está associada a alguma outra doença do tecido conjuntivo, é chamada de Síndrome de Sjögren _____.

- a) feminino - meia idade - secundária
- b) masculino - idade avançada - San Diego
- c) masculino - meia idade - San Diego
- d) feminino - idade avançada - San Diego
- e) feminino - idade avançada - composta

19) A região da mandíbula que tem maior incidência de fraturas por trauma é o(a):

- a) Ângulo.
- b) Corpo.
- c) Apófise condilar.
- d) Sínfise.
- e) Ramo.

20) Existem formas distintas descritas para realizar-se o tratamento das fraturas do zigoma. Uma delas foi descrita em 1927 e emprega o acesso temporal com um forte elevador passando sob a face medial do zigoma. Essa forma denomina-se Método de:

- a) Kent.
- b) Gerrie.
- c) Guerin.
- d) Knight.
- e) Gillies.

21) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A fratura de Guerin ocorre transversalmente pela maxila, acima do nível dos dentes.
- () A fratura Le Fort II também é denominada de disjunção craniofacial.
- () A fratura Le Fort II pode produzir aumento do espaço interorbitário.
- () A fratura Le Fort I pode envolver parte dos seios maxilares.
- () A fratura Le Fort I pode envolver parte da apófise pterigoide do osso esfenóide.

- a) C - E - E - E - C.
- b) E - C - C - C - E.
- c) C - E - C - C - C.
- d) E - C - E - C - C.
- e) C - C - C - C - E.

22) A modificação da técnica radiográfica extra bucal lateral de mandíbula, utilizada para exame de pacientes politraumatizados, em que a inclinação da cabeça é uma manobra de difícil execução, denomina-se modificação de:

- a) Winter.
- b) Clark.
- c) Hirtz.
- d) Djian.
- e) Waters.

23) Sobre as incidências utilizadas na grande maioria das vezes para radiografias da articulação temporomandibular, analisar os itens abaixo:

- I - A incidência lateral transfacial foi apresentada por McQueen.
- II - A técnica de Gillies é classificada como infracranial.
- III - A técnica de Grewcock é a que prevalece nos dias de hoje.
- IV - A técnica de Lindblom tem o plano de Frankfurt como orientação para posicionamento da cabeça do paciente.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente o item I.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens II e IV.
- e) Somente os itens I e IV.

24) A flora microbiológica normal da cavidade oral é composta por microrganismos:

- a) Gram-negativos aeróbios, principalmente *Streptococcus spp*; *Corynebacterium*; bactérias anaeróbias.
- b) Gram-negativos aeróbios, principalmente *Staphylococcus spp*; *Actinomyces spp*; bactérias anaeróbias, *Candida spp*.
- c) Gram-positivos aeróbios, principalmente *Streptococcus spp*; *Corynebacterium*; bactérias anaeróbias.
- d) Gram-positivos aeróbios, principalmente *Staphylococcus spp*; *Actinomyces spp*; bactérias anaeróbias, *Candida spp*.
- e) Gram-positivos aeróbios, principalmente *Streptococcus spp*; *Actinomyces spp*; bactérias anaeróbias, *Candida spp*.

25) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O cisto de erupção é o tipo mais comum de cisto odontogênico de desenvolvimento.
- () O cisto dentígero envolve a coroa de um dente incluso e está unido ao dente na junção esmalte-cimento.
- () O ceratocisto odontogênico origina-se de remanescentes celulares de lâmina embrionária na fase de mórula.
- () Cistos gengivais do recém-nascido são pequenos cistos superficiais contendo saliva.
- () O cisto odontogênico glandular tem ocorrência maior em mandíbula, com predileção pela região anterior.

- a) C - E - C - E - C.
- b) E - C - C - C - E.
- c) E - C - E - E - C.
- d) C - E - C - C - E.
- e) C - C - E - C - E.

26) Em relação aos leucócitos, analisar os itens abaixo:

- I - Os PMNs maduros medem 10-20µm de diâmetro e têm núcleo segmentado.
- II - Os neutrófilos são muito importantes na fagocitose e na digestão de agentes estranhos, como bactérias.
- III - Os eosinófilos são granulócitos com núcleo bilobulado que medem de 10 a 15µm de diâmetro.
- IV - O número de eosinófilos circulantes é aumentado pelo uso de corticoides.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente o item IV.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Somente os itens I, II e III.
- e) Somente os itens I, II e IV.

27) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Os três tipos de fios de sutura reabsorvíveis que são comumente usados para cirurgia oral e maxilofacial são o categute, o ácido _____ e um copolímero dos ácidos _____. Já os fios não reabsorvíveis mais comumente utilizados nessa área são os de seda, náilon, poliéster e polipropileno.

- a) poliglicólico - glicólico e láctico
- b) poliglatina - láctico e glicólico
- c) poliamida - acético e poliglicólico
- d) amida - glicólico e poliglicólico
- e) polilático - glicólico e poliglicólico

28) A classificação de A, B e C de Pell e Gregory, utilizada para diagnosticar a profundidade da impação de dentes, relata que:

- I - Na Classe A de Pell e Gregory, a superfície oclusal do terceiro molar superior está localizada entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar.
- II - Na Classe B de Pell e Gregory, a superfície oclusal do terceiro molar superior está localizada no mesmo nível do segundo molar.
- III - Na Classe C de Pell e Gregory, a superfície oclusal do terceiro molar superior está localizada abaixo da linha cervical do segundo molar.
- IV - A classificação de Pell e Gregory não é válida para dentes terceiros molares da maxila.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente o item IV.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.
- e) Somente os itens III e IV.

29) O germe dentário do terceiro molar pode ser visualizado radiograficamente a partir de qual idade do paciente?

- a) Quatro anos.
- b) Seis anos.
- c) Oito anos.
- d) Dez anos.
- e) Doze anos.

30) Qual das alternativas abaixo NÃO condiz com a literatura em termos de fatores que dificultam a cirurgia de dentes impactados?

- a) Contato com o segundo molar.
- b) Proximidade com o canal alveolar inferior.
- c) Posicionamento distoangular.
- d) Relacionamento tipo classe 3 como ramo.
- e) Posição tipo classe A em profundidade.